



BUCOGEL®

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0,12%

Venta libre
Industria Argentina

Gel antiséptico para uso tópico bucal.

COMPOSICION

Cada 100 g de gel contiene

Clorhexidina digluconato 20%.....0,6 g

Excipientes: (propilenglicol, azul patente V, hidroxipropilcelulosa, agua purificada) c.s.p.....100 g


ACCION TERAPEUTICA

Antiséptico bucal. Antiplaca bacteriana. Antibacteriano (Gram + y Gram -) y antifúngico con acción sobre los esporos. Activo sobre los gérmenes comúnmente causales de afecciones bacterianas periodontales y bucales. BUCOGEL® limita su acción a la zona aplicada evitando las manchas por exposición y retención del producto en los esmaltes sanos y las irritaciones de los tejidos blandos.


INDICACIONES

Control de la placa bacteriana y de los gérmenes causantes de infecciones en la boca. Inflamación o sangrado de las encías. Antisepsia en cirugía o procedimientos odontológicos. Prevención de la caries dental.


POSOLOGIA Y MODO DE APLICACION




1. Retire la tapa del pomo, extraiga la cánula aplicadora de la bolsa plástica y enrosque la cánula en el pomo.



2. Retire la tapa de la cánula.



3. Ubique la zona a tratar y aproxime la punta de la cánula sobre la misma.
4. Ejercer una leve presión sobre el pomo y deje fluir el gel en una cantidad apropiada para cubrir la zona afectada, de acuerdo a las indicaciones de su Odontólogo.



5. Cubra la cánula con su correspondiente tapa.
6. Lea atentamente la sección Precauciones y Advertencias, que se encuentra más adelante.

Repetir el procedimiento 2 a 3 veces por día de acuerdo a lo indicado por el Odontólogo.

En niños pequeños y en discapacitados el producto debe ser aplicado por un adulto.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia a la clorhexidina o a cualquiera de los componentes del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No utilizar el gel si el pomo y/o la cánula no se presentan en perfecto estado de conservación.
El producto es para uso personal y no debe ser compartido. No aplicar el gel con otro tipo de aplicador.
Una vez aplicado el gel es recomendable no realizar en forma inmediata un cepillado o enjuague bucal de la zona donde se aplica, dado que debe transcurrir -al menos- 2 horas antes de su remoción para que el principio activo pueda actuar adecuadamente. Si bien la concentración de clorhexidina en BUCOGEL® es del 0,12%, por ser aplicado sólo a las partes afectadas, las cantidades totales utilizables por dosis son muy inferiores a los contenidos de otras soluciones de clorhexidina, por lo que su ingestión eventual por barrido salival del gel no implica riesgos. En caso que la evolución de la lesión no sea favorable se recomienda volver a consultar a su Odontólogo.

EFFECTOS ADVERSOS

La mayoría de los efectos adversos por el uso bucal de la clorhexidina se refieren al uso prolongado sobre los tejidos sanos, generalmente de más de 7 días, manifestado por manchas en dientes, restauraciones, obturaciones, mucosas y lengua. En general, las manchas son transitorias o pueden requerir del cepillado de la superficie afectada a cargo del Odontólogo.

Irritación de los tejidos sanos.

Pigmentaciones.

Alteraciones transitorias del sabor. El uso local de BUCOGEL® minimiza la probabilidad de estos efectos colaterales.

SOBREDOSIFICACION

El producto no es tóxico aún en el caso de una ingesta accidental del contenido total del envase. Eventualmente puede ocurrir diarrea o dolores abdominales que deberán ser tratados sintomáticamente.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez - Buenos Aires: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Nacional Alejandro Posadas - Haedo (Provincia de Buenos Aires): (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACION

Envase conteniendo un pomo multilaminado con 20 gramos de gel y cánula aplicadora.

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz y humedad.

VISITE PERIODICAMENTE A SU ODONTOLOGO

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Gador

Al Cuidado de la Vida

Obtenga mayor información visitando nuestro sitio en internet: www.gador.com.ar

o solicítela por correo electrónico: info@gador.com.ar

Gador

GADOR S.A.

Darwin 429 - C1414CUI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: (011) 4858-9000.

Directora Técnica: Olga N. Greco - Farmacéutica.

Elaborado en Ruta Nacional 38 Km 1305, Parque Industrial "El Pantanillo" Provincia

de Catamarca. Producto médico autorizado por A.N.M.A.T PM-35-1

Fecha de última revisión: 10/2002

G00074300-02

