

# muelita

Benzocaína 20%

## Forte

GEL TÓPICO

Industria Argentina  
Venta Libre

### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

#### ¿Qué contiene MUELITA FORTE GEL?

Cada 100 g. contiene:

Benzocaína 20.0 g.

Excipientes: Polietilenglicol 400, Polietilenglicol 4000, Glicerina, Metilparabeno, Colorante Rojo punzó 4R, Sacarina sódica, Esencia de frutilla, Agua purificada, c.s.

**Acción:** Anestésico local.

#### ¿Para qué se usa MUELITA FORTE GEL?:

Alivio temporario del dolor de muelas o el ocasionado por aftas, llagas y lesiones provocadas por tratamientos de ortodoncia.

#### ¿Qué personas NO pueden recibir MUELITA FORTE GEL?:

**NO USE** este medicamento si tiene antecedentes de alergia a la Benzocaína o anestésicos relacionados como Procaína y Butacaína.

#### ¿Qué cuidados debo tener antes de utilizar este medicamento?:

**Use sólo en mucosa bucal**, no debe ser aplicado en otras partes del cuerpo. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos.

**Use la mínima cantidad posible, no exceda la dosis recomendada.**

Se han reportado casos de metahemoglobinemia tras el uso de benzocaína.

**“Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.”**

#### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy utilizando este medicamento?:

Si el dolor para el cual está utilizando este medicamento persiste por más de 7 días o empeora, consulte al médico.

La aplicación bucal de benzocaína puede originar problemas para tragar y por lo tanto riesgo de aspiración. Por lo que no se debe comer por una hora luego de su aplicación, ni masticar alimentos o chicles mientras persista el adormecimiento debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.

Suspenda el uso y consulte al médico si aparecen síntomas de debilidad, confusión, dolor de cabeza, dificultad para respirar y/o piel color pálida, grisácea o azulada, ya que pueden ser síntomas de metahemoglobinemia.

#### ¿Cómo se usa este medicamento?:

**Adultos y mayores de 18 años:** aplicar una fina capa sobre la zona afectada con los dedos o con un hisopo de algodón, hasta 4 veces por día.

**“Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños”**

**“Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico”**

#### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si utilicé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.  
Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247  
Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777  
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.  
Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.  
Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

#### ¿Tiene usted alguna pregunta?:

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a [info@cabuchi.com](mailto:info@cabuchi.com) o a través de la web: [www.cabuchi.com](http://www.cabuchi.com).  
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**Forma de conservación:** conservar a temperatura entre 15°C y 30°C.

#### Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan. C.P. 5220. Jesús María. Pcia. de Córdoba. Argentina.

**Director Técnico:** Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

#### Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 50139

Fecha de última revisión: 10 de junio del 2013

**Presentaciones:** pomos plásticos conteniendo 10g., 15g. y 20g.

# muelita

®

## Forte

### Benzocaína 20%

 **CABUCHI**  
Calidad que te cuida

Elaborado y Fraccionado por: **Laboratorios Cabuchi S.A.**  
Tucumán 1301 - Jesús María (X5220BCA) - Córdoba - Rep. Argentina.  
[www.cabuchi.com](http://www.cabuchi.com) - [info@cabuchi.com](mailto:info@cabuchi.com) - Tel.: 03525 - 445901 / 0800-466-7777