

ESTA CARA A LA
VISTA



10 mm



SAPONIC®

EXTRACTO DE INSAPONIFICABLES DE PALTA (*persea gratissima*) 100 mg
EXTRACTO DE INSAPONIFICABLES DE SOJA (*glycine max*) 200 mg

Control médico recomendado
Industria uruguaya

Cápsulas

COMPOSICIÓN

Cada cápsula de SAPONIC® contiene (*)
Extracto de insaponificables de palta (*persea gratissima*).....100 mg
Extracto de insaponificables de soja (*glycine max*).....200 mg
Excipientes c.s.
(*) Correspondiente a no menos de 90 mg de fitosteroles totales.

ACCIÓN TERAPÉUTICA Y FARMACOLÓGICA

Actúa sobre el trofismo del tejido conectivo, restaura el equilibrio metabólico cartilaginoso.

INDICACIONES

Rumatología. Tratamiento sintomático a largo plazo de la osteoartritis especialmente en cadera y rodillas.
Odontología. Tratamiento adyuvante de periodontopatías.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Se recomienda ingerir una cápsula al día durante una de las comidas, sin masti-carla y con abundante agua.

Duración del tratamiento

Rumatología. El tratamiento de la artrosis sintomática será de 3 a 6 meses, mínimo 3 meses.
Odontología. La duración del tratamiento será de 6 semanas a 3 meses, mínimo 5 semanas.

EFFECTOS COLATERALES Y EFFECTOS SECUNDARIOS

Infrecuentes. Este medicamento puede ocasionar en algunos pacientes efectos molestos tales como regurgitaciones con olor lipídico, que pueden evitarse al ingerir las cápsulas junto con las comidas.

Raros. Reacciones de hipersensibilidad.

Excepcionales. Aumento de las enzimas hepáticas séricas (transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma-glutamil transpeptidasa).

Frecuencia desconocida. Trastornos gastrointestinales como diarrea y dolor epigástrico.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

SAPONIC® pertenece al grupo conocido por su sigla en inglés SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis), [Fármacos modificadores de síntomas de acción lenta]. Los ensayos clínicos realizados con estas sustancias han demostrado una mejoría moderada en la sintomatología de la OA, actuando sobre los primeros síntomas con un comienzo de acción lento.

CONTRAINDICACIONES

SAPONIC® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a sus principios activos o a alguno de sus excipientes (polivinilpirrolidona, butilhidroxitolueno, dióxido de titanio, colorantes FD&C #1 y FD&C #5, gelatina).

PRECAUCIONES

Población pediátrica. No se recomienda el uso de SAPONIC® en niños y adolescentes hasta 18 años de edad ya que no hay estudios suficientes para establecer la seguridad y eficacia del uso.

Embarazo y lactancia. No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico o feto-tóxico. Por tanto, no se recomienda su administración durante el embarazo y la lactancia.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han informado.

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|
| Nomb. Producto: | SAPONIC | Presentación: | PROSPECTO |
| Cód. EAN: | | Cód. Interno: | 32226-003 |
| Tintas CMYK: | | Sustrato: | OBRA 56 - 60 g |
| Tintas Pantone: | Reflex blue | | |
| Barniz: | | | |
| Troquel: | NO | Fto. 90 x 190 mm Ab. | Plegado 30 x 190 mm |
| Aprobación: | 20/04/2018 | | |

Diseño & Fotografía Classic



15 mm

10 mm

INTERACCIONES

No se han informado.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el Centro de Toxicología (CIAT), tel. 1722.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30° C.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10, 20 y 30 cápsulas.

NO DEJE MEDICAMENTOS AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Gador

32226-003

Laboratorio Gador S.A. N° 342
La Paz 2257 - Montevideo
Tel. 2401 64 44* - Fax: 2401 18 51
D.T. Quim. Farm. Christian Díaz
Reg. M.S.P. N° 44629 - Ley 15443